

Bibliografia:

AA.VV., 2005.

Il lupo in Piemonte: azioni per la conoscenza e la conservazione della specie, per la prevenzione dei danni al bestiame domestico e per l'attuazione di un regime di coesistenza stabile tra lupo ed attività economiche.

Regione Piemonte, Relazione finale.

AGNELLI P., LUCCHESI M., 2009.

Micro e mesoteriofauna della Riserva Naturale Integrale di Sasso Fratino.

In: Bottacci A. (ed.), 2009 - La Riserva Naturale Integrale di Sasso Fratino: 1959-2009. 50 anni di conservazione della biodiversità. Corpo Forestale dello Stato, Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Pratovecchio; 193-206.

APOLLONIO M., MATTIOLI L., SCANDURA M., 2004.

Occurrence of black wolves in the Northern Appennines, Italy.

Acta Theriologica 49 (2): 281-285.

APOLLONIO M., MATTIOLI L., SCANDURA M., MAURI L., GAZZOLA A., AVANZINELLI E., 2004.

Wolves in the Casentinesi Forests: insights for wolf conservation in Italy from a protected area with a rich wild prey community.

Biological Conservation 120 (2004): 249-260.

ARRIGONI P.V., FERRETTI G., PADULA M., 2006.

La flora vascolare.

In: AA.VV.- La Riserva di luoghi naturali Orrido di Botri. Fondamenti naturalistici, storici e gestionali. Corpo Forestale dello Stato. Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Lucca.

ASA, C.S., PETERSON, E. K., SEAL, U. S., MECH, L. D., 1985.

Deposition of anal-sac secretion by captive wolves (*Canis lupus*).

Journal of Mammalogy 66: 89-93.

ASA C.S., MECH L.D., SEAL U.S., PLOTKA E.D., 1990.

The influence of social and endocrine factors on urine-marking by captive wolves (*Canis lupus*).

Hormones and Behaviour 24: 497-509.

BERNICCHIA A., RYVARDEN L., 1996.

Two new brown rot polypores from Italy.

Mycol. Helv. 8(2):3-10.

BERNICCHIA A., RYVARDEN L., 2003.

A new white-rot polypore from Italy.

Mycotaxon, 88: 219-224.

- BOITANI L., 1992.
 Wolf research and conservation in Italy.
Biological Conservation 61: 125-132.
- BOITANI L., 2003.
Wolf Conservation and recovery.
 In: "Wolves: Behavior, Ecology, and Conservation" (L.D. Mech e L. Boitani eds.), pp.317-340, The University of Chicago Press, Chicago, USA.
- BOSCAGLI G., 1985.
 Il Lupo.
 Lorenzini ed., Udine.
- BOSCAGLI G., BALDASSARRI F., TRIBUZI S., 2002.
Stima del popolamento di Lupo (Canis lupus) nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi attraverso un programma di formazione del Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato.
 Atti del Convegno "Il Lupo e i parchi". S.Sofia 12-13 aprile 2002.
- BOTTACCI A., RADICCHI S., ZOCCOLA A., PADULA M., CIAMPELLI P., TACCONI S., ANTONELLI A., BERTINELLI S., ALTERINI A., 2007.
 Gli alberi monumentali delle riserve naturali statali casentinesi (Appennino toscoro-magnolo).
Quad. Studi Nat. Romagna, 25: 7-23.
- BOTTACCI A. (ed.), 2009.
La Riserva Naturale Integrale di Sasso Fratino: 1959-2009. 50 anni di conservazione della biodiversità.
CFS/UTB Pratovecchio; 253.
- BRUNETTI R., 1984.
 Distribuzione storica del lupo in Piemonte, Valle d'Aosta e Canton Ticino.
Riv. Piem. St. Nat. 5: 7-22.
- CAGNOLARO L., ROSSO D., SPAGNESI M., VENTURI D., 1974.
 Rapporto sulla distribuzione del lupo in Italia e nei Cantoni Ticino e Grigioni.
Ricerche di Biologia della Selvaggina 59: 1-75.
- CAMPIELLO, A., 2009.
Censimento sperimentale della popolazione di cervo (Cervus elaphus) delle Riserve Naturali Biogenetiche Casentinesi, Appennino settentrionale.
 Tesi di laurea. Università di Bologna.
- CAPITANI C., 2007.
Distribuzione e dinamica di popolazione del lupo in provincia di Arezzo.
 In: Apollonio M., Mattioli L., 2007- Il lupo in Provincia di Arezzo. Studi sulla biologia della fauna. Provincia di Arezzo, Le Balze. 67-86.

- CARBYN L.N., 1997.
Unusual movement by bison, *Bison bison*, in response to wolf, *Canis lupus*, predation.
Canadian Field Naturalist 111: 461-462.
- CAZZOLI M.A., 1997/98.
Indagine sulle emergenze geo-morfologiche meritevoli di tutela e di attenzione.
Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Borsa di Studio.
- CIANFERONI F., FABIANO F., MAZZA G., ROCCHI S., TERZANI F., ZINETTI F., 2009.
Gli invertebrati della Riserva naturale Integrale di Sasso Fratino.
In: Bottacci A. (ed.), 2009 – La Riserva Naturale Integrale di Sasso Fratino: 1959-2009. 50 anni di conservazione della biodiversità. Corpo Forestale dello Stato, Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Pratovecchio; 227-248.
- CICOGNANI L., LUCCHESI M., TEDALDI G., 2009.
Ungulati selvatici e lupo nella Riserva Naturale Integrale di Sasso Fratino.
In: Bottacci A. (ed.), 2009 – La Riserva Naturale Integrale di Sasso Fratino: 1959-2009. 50 anni di conservazione della biodiversità. Corpo Forestale dello Stato, Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Pratovecchio; 161-185.
- CICOTTI, C., 2005.
La popolazione di Canis lupus nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna: primi risultati ed elaborazioni.
Tesi di laurea. Università di Bologna.
- CIUCCI P., MECH L.D., 1992.
Selection of wolf dens in relation to winter territories in northeastern Minnesota.
Journal of Mammalogy 73: 899-905.
- CIUCCI, P., 1994.
Movimenti, attività e uso delle risorse del lupo in due aree dell'Appennino centro-settentrionale.
Tesi di Dottorato. Univ. di Roma "La Sapienza".
- CIUCCI P., L. BOITANI, F. FRANCISCI, G. ANDREOLI, 1997.
Home range, activity and movements of a wolf pack in central Italy.
J. of Zoology 243. Pagg 803-819.
- CIUCCI P., BOITANI L., 1998.
Il lupo. Elementi di biologia, gestione, ricerca.
Istituto Nazionale per la fauna Selvatica "A.Ghigi", Documenti Tecnici 23: 1-111.

CIUCCI P., MAIORANO L., ANDREANI M., REGGIONI W., BOITANI L., 2005.
Dispersione a lungo raggio di un lupo dall'Appennino settentrionale alle Alpi Marittime: movimenti, comportamento spaziale ed eterogeneità ambientale.
Atti del V Congresso dell'Associazione Teriologica Italiana, Arezzo 10-12 Novembre 2005.
Hystrix, Italian Journal of Mammalogy (n.s.) supp. 2005: 65.

CIUCCI P., MAIORANO L., ANDREANI M., REGGIONI W., BOITANI L., 2005.
Dispersione a lungo raggio di un lupo dall'appennino settentrionale alle alpi marittime: movimenti, comportamento spaziale ed eterogeneità ambientale.
Hystrix, It. J. Mamm. (n.s.) supp. (2005)

COOK, S. J., NORRIS, D. R., THEBERGE, J. B., 1999.
Spatial dynamic of migratory wolf population in winter, south-central Ontario (1990-1995).
Canadian Journal of Zoology 77: 1740-1750.

CURSANO B., LUCCHESI M., 2009.
Note sull'avifauna della Riserva Naturale Integrale di Sasso Fratino.
In: Bottacci A. (ed.), 2009 – La Riserva Naturale Integrale di Sasso Fratino: 1959-2009. 50 anni di conservazione della biodiversità. Corpo Forestale dello Stato, Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Pratovecchio; 207-213.

DUCHAUFOR PH., 1977.
Pédologie 1.
Ed. Masson.

ESPOSITO C., 2007.
Il lupo. Presentazione di Luigi Boitani.
Animal lives, Franco Muzzio Editore. Pag. 128.

FERRONI L., BALDINI R.M., NARDI E., 2004.
Contributo alla conoscenza della flora della Val di Cintoia (Toscana centro-settentrionale).
Atti della S.T.S.N.; Memorie serie B vol. XCI.

FICO, R., 1996.
L'accertamento dei danni al bestiame causati da predatori.
Atti del Convegno Nazionale «Dalla Parte del lupo». Cerere (Ed.). Serie Atti e Studi del WWF Italia n. 10. Parma 9-10 Ottobre 1992. 42-53.

FINDO S., CHAVANCOVA B., 2004.
Home ranges of two wolf packs in the Slovak Carpathians.
Folia Zool., 53(1): 17-26.

FRITTS, S. H., MECH, L. D., 1981.
Dynamics, movements, and feeding ecology of a newly protected wolf population in northwestern Minnesota.
Wildlife Monographs, n. 80. The Wildlife Society, Bethesda, MD. Pag 79.

- FRITTS S.H., 1983.
Record dispersal by wolf from Minnesota.
Journal of Mammalogy 64: 45-77.
- FULLER, T. K., 1995.
Guidelines for gray wolf management in the northern Great Lakes Region.
Inter. Wolf center Tech. Publ. n. 271. Minnesota.
- GABBRIELLI A., SETTESOLDI E., 1977.
La storia della Foresta Casentinese nelle carte dell'Archivio dell'Opera del Duomo di Firenze dal secolo XIV al XIX.
Ministero Agricoltura e Foreste, Collana verde, n. 43, pp. 547.
- GAMBOGI R., 1998.
Studio di una popolazione di lupi dell'Appennino toscano orientale.
Tesi non pubblicata.
- GAZZOLA A., AVANZINELLI E., MAURI L., SCANDURA M., APOLLONIO M., 2002.
Temporal changes of bowling in south European wolf packs.
Italian Journal of Zoology 69: 157-161.
- GESE E.M., MECH L.D., 1991.
Dispersal of wolves (*Canis lupus*) in Northeastern Minnesota, 1969-1989.
Canadian Journal of Zoology 69: 2946-2955.
- GONNELLI V., ZOCCOLA A., NORCINI F., 2001.
Contributo alla conoscenza della flora pteridologica del Parco nazionale „Foreste casentinesi, Monte falterona e campigna“. I. Le Pteridofite della Riserva Naturale Biogenetica di „Badia Prataglia-Lama“.
Quad. Studi Nat. Romagna, 14:69-87.
- GONNELLI V., BOTTACCI A., 2009.
Il clima di Sasso Fratino.
In: Bottacci A. (ed.), 2009 – La Riserva Naturale Integrale di Sasso Fratino: 1959-2009. 50 anni di conservazione della biodiversità. Corpo Forestale dello Stato, Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Pratovecchio; 39-46.
- GONNELLI V., BOTTACCI A., ZOCCOLA A., 2009.
Secondo contributo alla conoscenza della flora della Riserva Naturale Integrale di Sasso Fratino (Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterone e Campigna).
In: Bottacci A. (ed.), 2009 – La Riserva Naturale Integrale di Sasso Fratino: 1959-2009. 50 anni di conservazione della biodiversità. Corpo Forestale dello Stato, Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Pratovecchio 75-118.

- GULA R., HAUSKNECHT R., KUEHN R., 2009.
Evidence of wolf dispersal in anthropogenic habitats of the Polish Carpathian Mountains.
Biodivers Conserv (2009) 18: 2173-2184.
- HARRINGTON F.H., MECH L.D., 1979.
Wolf howling and its role in territory maintenance.
Behaviour 68: 249-297.
- JOSLIN P.W.B., 1966.
Summer activities of two timber wolf (Canis lupus) packs in Algonquin Park.
Master's thesis, University of Toronto, Ontario, pp 99.
- JOSLIN P.W.B., 1967.
Movements and home sites of timber wolves in Algonquin Park.
American Zoologist 7: 279-288.
- KLEIMAN, D. G.; 1966.
Scent marking in the Canidae.
Symp. Zool. Soc. (London) 18: 167-177.
- KUSAK J., MAJIC SKRBINSEK A., HUBER D., 2005.
Home ranges, movements, and activity of wolves (*Canis lupus*) in the Dalmatian part of Dinarids, Croatia.
Eur. J. Wildl. Res. (2005) 51: 254-262.
- LOVARI C., MATTIOLI L., MAZZARONE V., APOLLONIO M., SIEMONI N., ORLANDI L., CASTELLANI F., GUALAZZI S., TRINCA M., TURCHINI I., BALDINI G., BORCHI S., TONI C., 2000.
Gli ungulati delle Foreste Casentinesi. Dieci anni di monitoraggio: 1988-1997.
Edizioni Regione Toscana.
- LUCCHESI M., G. CRUDELE, G. QUILGHINI, A. ZOCCOLA, 2005.
La presenza del muflone (*Ovis [orientalis] musimon*) nelle Riserve Naturali Biogenetiche Casentinesi (Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna).
Habitat 147: 39-51.
- MASSEI M., 1981.
Piano di Gestione Naturalistica della Riserva Naturale Integrale di Sasso Fratino valevole per il decennio 1980-89.
Gestione ex-ASFD Ufficio amministrazione di Pratovecchio, Centro Stampa Palagi Firenze.
- MECH L.D., 1970.
The wolf: the ecology and behavior of an endangered species.
Natural History Press, Garden City, USA.

- MECH L.D., KARNS P.D., 1977.
Role of the wolf in a deer decline in the Superior National Park.
 U.S. Forest Serv. Res.148. Pagg. 1-23.
- MECH L.D., 1994.
 Buffer zone of territories of gray wolves as region of intraspecific strife.
Journal of Mammalogy 75: 199-202.
- MECH L.D., ADAMS L.G., MEIER T.J., BURCH J.W., DALE B.W., 1998.
The wolves of Denali.
 University of Minnesota Press, Minneapolis.
- MECH L.D., WOLFE P., PACKARD J.M., 1999.
 Regurgitative food transfer among wild wolves.
Canadian Journal of Zoology 77: 1192-1195.
- MENCUCCI M., AGOSTINI N., D'AMICO C., FABBRI M., CANIGLIA R., FABBRI E., GRECO C., RANDI E., 2006.
Il lupo nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna.
 In: Caniglia R., Fabbri E., Greco C., Randi E., 2006 – Ricerca scientifica e strategie per la conservazione del lupo (*Canis lupus*) in Italia. Quaderni di Conservazione della Natura, Numero 33, pp 197- 222.
- NARDI BERTI R., 1972.
Prime indagini sulle caratteristiche dei soprassuoli della Riserva Naturale Integrale di Sasso Fratino (Foreste Casentinesi).
 L'Italia Forestale e Montana XXVII- Fasc. 4: 156-165.
- NORCINI F., ZOCCOLA A., 1995.
 Segnalazioni floristiche Italiane: 813 *Matteuccia struthiopteris* (L.) Tod. (Athyraceae).
Inform. Bot. Ital. Firenze;27 (2-3): 282-283.
- NOWAK R.M., 1995.
Another look at wolf taxonomy.
 In: Ecology and conservation of wolves in a changing world (L.N. Carbyn, S.H. Fritts e D.R. Seip eds.), pp. 375-397, Canadian Circumpolar Institute, Edmonton, Canada.
- NOWAK R.M., FEDEROFF N.E., 2002.
 The systematic status of the Italian wolf *Canis lupus*.
Acta Theriologica 47: 333-338.
- NOWAK R.M., 2003.
Wolf evolution and taxonomy.
 In: Wolves:Behaviour, Ecology, and Conservation (L.D. Mech e L. Boitani eds.), pp.239-258, The University of Chicago Press, Chicago, USA.

OKARMA H., JEDRZEJEWSKI W., SCHMIDT K., SNIEZKO S., BUNEVICH A.N., JEDRZEJEWSKA B., 1998.

Home range of wolves in Bialowieza Primeval Forest, Poland, compared with other Eurasian populations.

Journal of Mammalogy 79: 842-852.

OLIVARI S., 2009.

Geologia e pedologia della Riserva Naturale Integrale di Sasso Fratino.

In: Bottacci A. (ed.), 2009 – La Riserva Naturale Integrale di Sasso Fratino: 1959-2009. 50 anni di conservazione della biodiversità. Corpo Forestale dello Stato, Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Pratovecchio; 47-67.

PADULA M., 1988.

Descrizione naturalistica delle Foreste Demaniali Casentinesi di Campigna-Lama nell'Appennino Tosco-Emiliano.

Regione Emilia-Romagna.

PADULA M., 1998.

La Riserva Naturale Integrale di Sasso Fratino (Emilia-Romagna).

In: Corbetta F., Abbate G., Frattaroli A., Pirone G. "S.O.S. Verde Vegetazioni e specie da conservare", Edagricole Bologna.

PETERS R., MECH L.D., 1975.

Scent-marking in wolves.

American Scientist 63: 628-637.

PETERSON R. O., WOLLINGTON J. D., BAILEY T. N., 1984.

Wolves of the Kenai peninsula, Alaska.

Wildl. monogr. 88. Pagg. 1-52.

PIGNATTI S., 1982.

Flora d'Italia.

Voll. 1-3 Edagricole.

RAUSCH R.A., 1967.

Some aspect of the population ecology of wolves, Alaska.

American Zoologist 7: 253-265.

RAVAGLIOLI M., VICIANI D., ZOCCOLA A., SELVI F. & BOTTACCI A., 2009.

Sulla presenza di boschi dell'alleanza Tilio-Acerion nella Riserva Naturale Integrale di Sasso Fratino e nella Riserva naturale Biogenetica di Badia Prataglia-Lama (Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi; Emilia-Romagna).

Quad. Studi Nat. Romagna; 27 (2008): 73-80.

RIVAS-MARTÍNEZ S., SÁNCHEZ-MATA D., MANUEL C., 1999.

North American boreal and western temperate forest vegetation.

Itinera Geobotanica 12: 5-316.

- RIVAS-MARTINEZ S., 2004.
Global Bioclimatics. Clasificación Bioclimatica de la Tierra.
 Sito internet: <http://www.globalclimatics.org/book/bioc/bioc1.pdf>
- ROTHMAN R.J., MECH L.D., 1979.
 Scent-marking in lone wolves and newly formed pairs.
Animal Behavior 27: 750-760.
- RUTTER R.J., PIMLOTT D.H., 1968.
The World of the Wolf.
 Lippincott Co., Philadelphia, USA.
- RYON J., BROWN R.E., 1990.
Urine marking in female wolves (Canis lupus): an indicator of dominance status and reproductive state.
Chemical Signals in Vertebrates 5. 346-451.
- SANSONE A., 1915.
Relazione sull'Azienda del demanio forestale dello Stato (1.7.1910-30.6.1914).
 Min. Agric., Ind. e Comm., Roma: 61-97.
- SAVOLAINEN P., ZHANG Y., LUO J., LUNDEBERG J., LEITNER T., 2002.
 Genetic evidence for an East Asian origin of domestic dogs.
Science 298: 1610-1613.
- SCHMIDT P.A., MECH L.D., 1997.
 Wolf pack size and food acquisition.
American Naturalist 150: 513-517.
- TEDALDI G., 2009.
Gli anfibi e i rettili della Riserva Naturale Integrale di Sasso Fratino.
 In: Bottacci A. (ed.), 2009 – La Riserva Naturale Integrale di Sasso Fratino: 1959-2009. 50 anni di conservazione della biodiversità. Corpo Forestale dello Stato, Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Pratovecchio; 221-226
- TEDALDI G., 2009.
Il gatto selvatico nelle Foreste Casentinesi.
 In: Bottacci A. (ed.), 2009 – La Riserva Naturale Integrale di Sasso Fratino: 1959-2009. 50 anni di conservazione della biodiversità. Corpo Forestale dello Stato, Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Pratovecchio; 190-191.
- THEUERKAUF J., JEDREZEJEWSKI W., SCHMIDT K., GULA R., 2003.
 Spatiotemporal segregation of wolves from humans in the Bialowieza Forest (Poland).
Journal of wildlife management 67(4): 706-716.

VENANZONI R., PEDROTTI F., 1995.

Il clima.

In: Pignatti S. (ed.), *Ecologia Vegetale*. UTET; Torino: 531 pp.

VERDECCHIA M., AGOSTINI N., VICIANI D., UBALDI D., MIOZZO M., 2009.

Carta della vegetazione e itinerari botanici nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna.

SELCA, Firenze.

VICIANI D., AGOSTINI N., 2008.

La carta della vegetazione del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna (Appennino Tosco-Romagnolo): note illustrative.

Quad. Studi Nat. Romagna 27 (2008): 97-134.

VIVIANI A., GAZZOLA A., SCANDURA M., 2007.

4. Il lupo: un predatore sociale ed adattabile.

In: Apollonio M., Mattioli L., 2007. *Il lupo in Provincia di Arezzo. Studi sulla biologia della fauna*. Provincia di Arezzo, Le Balze. 29-44.

VOIGT, D. R., KOLENOSKY, G. B., PIMLOTT, D. H., 1976.

Changes in summer foods of wolves in central Ontario.

Journal of Wildlife Management 40: 658-663.

WALTON L. R., CLUFF H. D., PAQUET P. C., RAMSAY M. A., 2001.

Movement patterns of barren-ground wolves in the Central Canadian Arctic.

Journal of Mammalogy, 82(3): 867-876.

WHITE K. A. J., LEWIS M. A., MURRAY J. D., 1996.

A Model for Wolf-pack Territory Formation and Maintenance.

J. theor. Biol. (1996) 178, 29-43.

ZIMEN, E., BOITANI, L., 1975.

Number and distribution of wolves in Italy.

Z. Säugetierkunde 40: 102-112.

ZIMEN E., 1976.

On the regulation of pack size in wolves.

Zeitschrift für Tierpsychologie 40: 300-341.